

Infotahvli välja-
andmist toetas



Infotahvli välja-
andmise algatas
Tõrva Gümnaasium



Riiska järve kalad

Riiska järv


Valga maantee ääres asuv Riiska järv on madalate kallastega, liivase põhja ja rohkete allikatega. Järve sügavuseks on mõõdetud 12,2 m ja pindalaks 5 ha. Järve äärde on rajatud ilus liivarand.

Riiska järve arvukavamad kalaliigid on mudamaim, särg ja ahven. Kalastajate meeleheaks elavad siin võrreldes teiste väikejärvedega prisked ahvenad, aga võib saada ka haugi, linaskit, latikat ja isegi ka karpkala.

Mudamaim

Mudamaim on meie kalafauna üks väiksemaid esindajaid, tema kehapikkus on 3 kuni 6 cm. Nad armastavad taimestikurikkaid ja sooje veekogusid. Oma väikese kasvu tõttu hoiudavad nad parvedesse, mis tegutsevad päevasel ajal ja veekogu pinnalähedastes kihtides.

Et mudamaim on pisike kala, siis pole ka ta eluiga pikk - see ulatub kõigest




4 aastani. Inimesed mudamaimu eriti ei hinda. Ta on teiste kalade toidu-konkurent, haiguste kandja ja marja hävitaja. Looduses on mudamaim toiduks paljudele röövkaladele ja veelindudele.

Ahven

Ahvenat peetakse suhteliselt paigalise eluviisiga kalaks, kes on vajadus korral võimeline ette võtma ka suhteliselt pikki ja kiireid rändeid. Tänu heale kohastumisvõimele võime ahvenaid leida väga eriliimelistest veekogudest: merest kuini rabajärvedeni välja. Nooremad ahvenad hoiudavad tavaliselt parvedesse, eelistades esimesel elusüvel avavett. Ühe- ja kaheaastased hoiudavad juba rohkem taimede ja muude varjupaikade lähedusse. Mida suuremaks muutub röövtoidu osakaal, seda üksiklasemaks muutub ahvenate eluviis.

Ahven on tuntud oma heamaitseliku liha poolest ning on seetõttu tunnustatud sportlikus kalapüügis. Ahvena populaarsust soodustab veelgi tema aastaringne püütavus ja seda praktiliselt kõigi meil kasutatavate püünistega.



Kalade toit

Kuigi meie kalaliigid söövad väga mitmekesist toitu, võime neid siiski toidu iseloomu järgi jagada kahte rühma - **rööv- ja lepiskalad**.


Röövkalade põhitoidu moodustavad teised kalad ja nende mari ning seetõttu on neid mitu korda vähem kui lepiskalu. Meie suurimad ja tuntumad röövkalad on haug, ahven, koha, jõeforell, aga ka angerjas, säga ja luts.

Väikeste **lepiskalade** nagu mudamaim, viidikas ja luukarits põhimeenüüse kuulu zooplankton (vesikirbulised ja aerjalalised). Põhiliselt pakub aga meie vetes lepiskaladele huvi eelkõige põhjaloomastik - putukad ja nende vastsed, karbid, väheharjasussid. Kuigi enamikes meie veekogudes leidub suurtaimi, maiustavad penikeeltega ja vesikatudega karkalalised - roosärg, särg ja linask.

Kalade sigimine

Kala elu algab pisikesest 1-5 mm suurusest marjaterast. Alguses võib tilluke kala marjatera sees hõljuda vees, või olla limaga kinni kleebitud taimede, kivide või millegi muu külge. Marjaterast areneb väike läbipaistev maim, millel on ainult silmatäpp hästi märgatav. Pisike kalahakatis liigub viikalt ja sööb aplalt endast väiksemaid vees hõljuvaid loomakesi.

Kuna suur osa kalamarja ja maime süüakse ära, siis tuleb kaladel kudedada väga palju marjateri (lõhi koeb 20 000 marjatera, aga haug isegi kuni 200 000 tükki).



KEVAD			SUVI			SÜGIS			TALV		
MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DET	JAN	VEB
	Haug		Luukarits					Jõeforell			
	Ahven		Koger							Luts	
	Särg		Linask					Lõhi			
	Angerjas										

Eesti kalade kudemisajad.